

# JANGAN BIMBANG, ANDA BOLEH MENCEGAH ULSER KAKI

**Langkah-langkah pencegahan:** Lihat panduan untuk langkah-langkah yang boleh anda ambil untuk mengelakkan ulcer kaki!

## Tindakan awal:

Ketahuilah bila anda patut berjumpa dengan petugas kesihatan untuk memeriksa kaki!

**Jika anda ada sebarang soalan atau kemosyikilan berbincanglah dengan petugas kesihatan anda!**

## KES ULSER KAKI BOLEH DICEGAH.<sup>1</sup>

1. Boulton AJM. The diabetic foot. Diabet Med 2006;34:87-90.



## LINDUNGI KAKI ANDA

### Senarai semak langkah penjagaan kaki:

- Adakah kaki anda telah diperiksa oleh petugas kesihatan untuk penilaian risiko dalam 12 bulan yang terdahulu?
- Adakah anda ketahui bila lagi kaki anda perlu diperiksa oleh petugas?
- Adakah anda ketahui bila lagi kaki anda perlu diperiksa oleh petugas?

**Untuk maklumat lanjut**  
[savefeetsavelives.my](http://savefeetsavelives.my)  
mengandungi maklumat terperinci, panduan dan video.

**Hubungi doktor anda jika anda perasan perubahan yang merisaukan.**

Nama Doktor:

Nombor Telefon Doktor:

Alamat Klinik:



## SELAMATKAN KAKI, SELAMATKAN NYAWA

Jika anda menghidapi kencing manis, ulcer kaki boleh jadi serius. Ketahuilah bagaimana anda boleh mencegah ulcer kaki.



**D - FOOT**  
international  
Supported by D-Foot International

**MENYEMBUHKU LUKA,  
SELAMATKAN KAKI,  
SELAMATKAN NYAWA.**

Program dari Urgo Medical



**MENYEMBUHKU LUKA,  
SELAMATKAN KAKI,  
SELAMATKAN NYAWA.**

Program dari Urgo Medical

# ULSER KAKI DIABETIK: FAKTA-FAKTA

! 1 DALAM 4 PENGHIDAP KENCING MANIS BOLEH DAPAT ULSER KAKI<sup>1</sup>

! AMPUTASI KAKI DILAKUKAN SETIAP 20 SAAT AKIBAT KENCING MANIS<sup>2</sup>

! JIKA TIDAK DIRAWAT DENGAN CEPAT, ULSER KAKI DIABETIK BOLEH MENGANCAM NYAWA

Berjumpalah dengan petugas kesihatan untuk menilai tahap risiko anda



Risiko Ulser  
**Sangat Rendah**  
Ciri-Ciri  
Tiada LOPS\* dan Tiada PAD\*\*  
Kekerapan pemeriksaan oleh petugas kesihatan?  
Setahun sekali



Risiko Ulser  
**Rendah**  
Ciri-Ciri  
LOPS\* dan PAD\*\*  
Kekerapan pemeriksaan oleh petugas kesihatan?  
Setiap 6-12 bulan



Risiko Ulser  
**Sederhana**  
Ciri-Ciri  
LOPS\* + PAD\*\*, atau LOPS\* + kecacatan kaki atau PAD\*\* + kecacatan kaki  
Kekerapan pemeriksaan oleh petugas kesihatan?  
Setiap 3-6 bulan



Risiko Ulser  
**Tinggi**  
Ciri-Ciri  
LOPS\* atau PAD\*\*, dan satu atau lebih daripada yang berikut:  
• sejara ulser kaki  
• amputasi kaki (major/ minor)  
• penyakit ginjal peringkat terakhir  
Kekerapan pemeriksaan oleh petugas kesihatan?  
Setiap 1-3 bulan

Loss of Protective Sensation (LOPS) : Kekurangan sensasi perlindungan Kencing manis boleh menyebabkan LOPS akibat kerosakan saraf. Ini boleh menyebabkan kecederaan tidak dikesan dan kejadian ulser.

Disease Peripheral Artery Disease (PAD) : Penyakit arteri periferal Penyakit arteri periferal merupakan kesempitan salur darah ke kaki yang menyebabkan peredaran darah yang lemah dan kekurangan darah ke otot-otot.

## Empat langkah untuk melindungi kaki dan mencegah ulser kaki



### Langkah 1: Memeriksa paras gula anda

Pastikan paras gula anda ada di dalam julat sasaran.



### Langkah 2: Perjagaan kaki harian

Cuci kaki anda dengan air suam, keringkan dan gunakan krim pelembap jika diperlukan.



### Langkah 3: Memeriksa kaki setiap hari


Periksa kaki anda untuk luka. Jangan lupa memeriksa tapak kaki dan di celah-celah jari. Anda boleh meminta pertolongan jururawat atau doktor anda.

! **Pastikan kaki anda diperiksa oleh petugas kesihatan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk penilaian risiko ulser.**



### Langkah 4: Kasut yang sesuai

- ✗ Elakkan daripada jalan berkaki ayam, memakai stokin sahaja, atau menggunakan selipar bertapak nipis.
- ✗ Jangan memakai stokin ke paras lutut atau yang terlalu ketat.
- ✓ Menggunakan saiz kasut yang sesuai: Saiz dalam kasut sepatutnya 1-2cm melebihi panjang kaki untuk membenarkan peredaran udara, lebar dalam kasut bersamaan dengan lebar kaki, dan ketinggian yang memberi cukup ruang untuk jari kaki.
- ✗ Elakkan saiz kasut yang terlalu kecil atau kasut yang ada hujung yang sempit.



✓ Kasut yang membenarkan peredaran udara yang secukupnya.



✗ Kasut yang memberi sokongan and tekanan yang secukupnya kepada kaki.



**PERLUKAN SEORANG DOKTOR?**  
Anda perlu berjumpa dengan doktor dengan segera jika perasan adanya:

- ✗ Ulser
- ✗ Luka
- ✗ Bengkak atau kemerahan
- ✗ Calar
- ✗ Lepuh
- ✗ Atau rasa sakit kaki

Untuk video dan maklumat lanjut,  
sila layari [savefeetsavelives.my](http://savefeetsavelives.my)